

Klippensittich

Wissenschaftlich: *Neophema petrophil*
Englisch: *Rock parrot*

Herkunft & Lebensraum

- ▶ Ursprung: Westliches Australien, speziell die Region um die Küstengebirge und das trockene Inland
- ▶ Lebensraum: und Klippenlandschaften, trockene Busch- und Graslandschaften, sie bevorzugen Bereiche mit steinigen oder felsigen Böden
- ▶ Besondere Anpassungen:
 - ❖ Sehr anpassungsfähig an trockene und karge Umgebungen
 - ❖ Können gut auf felsigen Klippen klettern
 - ❖ Leben oft in großen, geselligen Gruppen

Einführung in Europa & Deutschland

- ▶ Aktuell keine Haltung in Europa bekannt

Erscheinungsbild & Wildfarbe

- ▶ Größe: Etwa 22 cm
- ▶ Gewicht: Rund 45–65 g
- ▶ Wildfarbe: Scheitel und Körperoberseite bräunlich oliv, Stirnband hell-/dunkelblau, Bauch bräunlich gelb, an den Flanken leuchtend gelb
- ▶ Geschlechtsunterschiede:
 - ❖ Hähne intensiver gefärbt als Hennen, Scheitel und Hinterkopf bronzegelb, bei einigen Hähnen oranger Bauchfleck vorhanden
 - ❖ Hennen wirken matter, weniger ausgeprägtes blaues Stirnband

Farbmutationen

- ▶ Keine

Ernährung

- ▶ entfällt

Haltungsmöglichkeiten

- ▶ entfällt

Verhalten & Charakter

- ▶ Lebt außerhalb der Paarungszeit paarweise oder in kleinen Trupps zusammen
- ▶ Während der Fortpflanzungszeit schließt er sich zu Brutkolonien zusammen

Lebenserwartung

- ▶ In freier Wildbahn: ...
- ▶ In Menschenobhut: entfällt

Fortpflanzung & Zucht

- ▶ Brutzeit: Frühling und Frühsommer in Australien (August bis Dezemberr)
- ▶ Nest: Felsspalten oder unter Felsvorsprüngen
- ▶ Gelege: 4–6 Eier
- ▶ Brutdauer: 18–21 Tage
- ▶ Nestlingszeit: Junge fliegen mit etwa 4–5 Wochen aus

Gefährdungsstatus

- IUCN-Status: Nicht gefährdet (Least Concern)
- Gefährdungen: Geringe Bedrohung durch Lebensraumverlust, keine größeren Gefährdungen

Rechtliches & Schutzstatus in Europa

- ▶ entfällt

Weiterführende Quellen

- ▶ Wikipedia: <https://de.wikipedia.org/wiki/Klippersittich>